骨粗鬆症治療薬

Actonel Tablet 2.5mg
エビスタ60
Viviant 20mg
ビビアント 20mg

次のページの、のみかたを
よく読んで服用してください。
お薬の効果を最大限に引き出し、
副作用を減らすため、必ず次のように
のんでください。
カレンダー
のみ忘れないように
シールをカレンダーに貼っておきましょう
フォサマック
フォサマック
35mg
骨粗鬆症治療薬
2錠
PTP
フォサマック®錠35mg
週1回1錠のむお薬です。
（毎日のむお薬ではありません。）
1週間のうち都合の良い日を決めてください。
ようび
GS1-RSS
MSD株式会社
フォサマック錠35mg 2錠
週1回1錠のむお薬です。
この薬に関するお問い合わせ
カスタマーサポートセンター
0120-024-964
受付:月～金9:00～18:00（祝日、当社休日は除く）
合紙
成形シート
週1回1錠のむお薬です。
週目
月
日
ようび
お薬をのむときは、
右図のように
おしだしてください。
おしだす
8531-2
毎週1回、決められた日に1錠を下記の手順でのんでください。
朝、起きたときに（食事の前に）1錠を
コップ1杯の水（注）約180cc）と 一緒にのんでください。
注）水道水やミネラルウォーター（国内産）で のんでください。
のんでから少なくとも30分間は横に ならず、
水以外の飲食、他のお薬の服用はさけてください。
（のんでから30分以上すぎて横になる場合は、
最初の食事をとってからにしてください）
このお薬をかんだり、口の中で溶かしたりしないでください。
胸やけ、嚥下時の痛み、のみ込みにくさを 感じた場合には、すぐに主治医
または薬剤師に相談してください。
のみ忘れたとき
もしのみ忘れた場合には、気付いた日の翌朝に1錠をのんで
ください。 次からは、決められた日にのんでください。
但し、決して同じ日に2錠をのまないでください。
のみ方についてご質問がある場合には、主治医または薬剤師にご相談ください。