

アレルギー疾患治療薬製剤写真一覧

監修

東京女子医科大学 皮膚科 教授 **川島 眞** 先生、日本医科大学 耳鼻咽喉科 教授 **大久保 公裕** 先生、東京女子医科大学 眼科 教授 **高村 悦子** 先生

経口薬-第二世代抗ヒスタミン薬

カテゴリー色別: 第二世代抗ヒスタミン薬 (オレンジ) ケミカルメディエーター経腸吸収薬 (緑) その他 (青)

アレロック [協和発酵キリン]

(オロパタジン塩酸塩)



用法・用量	用法・用量	用法・用量	用法・用量
●OD錠(口腔内崩壊錠) 2.5mg	●OD錠(口腔内崩壊錠) 5mg	●錠 2.5mg	●錠 5mg
成人 1回5mgを1日2回朝及び就寝前	成人 1回5mgを1日2回朝及び就寝前	成人 1回5mgを1日2回朝及び就寝前	成人 1回5mgを1日2回朝及び就寝前
小児 7歳以上 1回5mgを1日2回朝及び就寝前	小児 7歳以上 1回5mgを1日2回朝及び就寝前	小児 7歳以上 1回5mgを1日2回朝及び就寝前	小児 7歳以上 1回5mgを1日2回朝及び就寝前

アレグラ [サノフィ・アベンティス]

(フェキソフェナジン塩酸塩)



用法・用量	用法・用量
●錠 30mg	●錠 60mg
成人 1回60mgを1日2回	成人 1回60mgを1日2回
小児 7歳以上12歳未満 1回30mgを1日2回	小児 12歳以上 1回60mgを1日2回

アレジオン [日本ベーリンガーインゲルハイム]

(エビナスチン塩酸塩)



用法・用量	用法・用量
●錠 10mg	●錠 10mg
成人 喘息・哮喘等: 1回20mgを1日1回 アレルギー性鼻炎: 1回10~20mgを1日1回	成人 喘息・哮喘等: 1回20mgを1日1回 アレルギー性鼻炎: 1回10~20mgを1日1回
小児 —	小児 —

アレジオン [日本ベーリンガーインゲルハイム]

(エビナスチン塩酸塩)



用法・用量	用法・用量
●錠 20mg	●ドライシロップ1% 5mg/0.5g, 10mg/1g, 20mg/2g, [100g, 250g]
成人 喘息・哮喘等: 1回20mgを1日1回 アレルギー性鼻炎: 1回10~20mgを1日1回	成人 喘息・哮喘等: 1回20mgを1日1回 アレルギー性鼻炎: 1回10~20mgを1日1回
小児 —	小児 喘息等: 1回0.5mg/kgを1日1回 アレルギー性鼻炎: 1回0.25~0.5mg/kgを1日1回

エバステル [大日本住友]

(エバステル)



用法・用量	用法・用量	用法・用量	用法・用量
●錠 5mg	●錠 10mg	●OD錠(口腔内崩壊錠) 5mg	●OD錠(口腔内崩壊錠) 10mg
成人 1回5~10mgを1日1回	成人 1回5~10mgを1日1回	成人 1回5~10mgを1日1回	成人 1回5~10mgを1日1回
小児 —	小児 —	小児 —	小児 —

クラリチン [MSD・塩野義]

(ロラタジン)



用法・用量	用法・用量	用法・用量	用法・用量
●錠 10mg	●レディタブ錠(口腔内速溶錠) 10mg	●ドライシロップ1% 5mg/0.5g, [100g]	●錠 5mg
成人 1回10mgを1日1回食後	成人 1回10mgを1日1回食後	成人 1回10mgを1日1回食後	成人 1回5mgを1日1回就寝前
小児 7歳以上 1回10mgを1日1回食後	小児 7歳以上 1回10mgを1日1回食後	小児 3歳以上7歳未満 1回5mgを1日1回食後 7歳以上 1回10mgを1日1回食後	小児 7歳以上15歳未満 1回2.5mgを1日2回朝食後及び就寝前

ザイザル [グラクソ・スミスクライン]

(レボセチリジン塩酸塩)



用法・用量	用法・用量
●錠 5mg	●錠 5mg
成人 1回5mgを1日1回就寝前	成人 1回5mgを1日1回就寝前
小児 7歳以上15歳未満 1回2.5mgを1日2回朝食後及び就寝前	小児 7歳以上15歳未満 1回2.5mgを1日2回朝食後及び就寝前

ジルテック [第一三共・ユーシービー・ジャパン・グラクソ・スミスクライン]

(セチリジン塩酸塩)



用法・用量	用法・用量	用法・用量	用法・用量
●錠 5mg	●錠 10mg	●錠 5mg	●錠 10mg
成人 1回10mgを1日1回就寝前	成人 1回10mgを1日1回就寝前	成人 1回10mgを1日1回就寝前	成人 1回10mgを1日1回就寝前
小児 7歳以上15歳未満 1回5mgを1日2回朝食後及び就寝前	小児 7歳以上15歳未満 1回5mgを1日2回朝食後及び就寝前	小児 2歳以上7歳未満 1回2.5mgを1日2回朝食後及び就寝前 7歳以上15歳未満 1回5mgを1日2回朝食後及び就寝前	小児 2歳以上7歳未満 1回2.5mgを1日2回朝食後及び就寝前 7歳以上15歳未満 1回5mgを1日2回朝食後及び就寝前

その他

(才生村ト三ノ)



●ドライシロップ2% 5mg/0.25g, 10mg/0.5g, [100g, 500g]

1回30mgを1日2回朝及び夕食前

1回0.5mg/kgを1日2回頓及T/F就寝前

(ケトチフェンフマル酸塩)



●シロップ0.02%〔500ml〕

(エメダス手ソフマル酸塩)




●カプセル 2mg

1回1～2mgを1日2回朝食後及び就寝前

*用法・用量は有効成分量で記載 *ドライシロップ・細粒の表示:成分量/製剤量〔バラ包装製剤量〕 *シロップの表示:〔製剤量〕

経口薬-ケミカルメディエーター遊離抑制薬・その他の抗アレルギー薬

カテゴリ色別: 第二世代 低ヒスタミン薬 ケミカルメディエーター遊離抑制薬 その他

ケミカルメディエーター遊離抑制薬	アレギサル [田辺三菱]		ベミラストン [アルフレッサ ファーマ]		リザベン [キッセイ薬品工業]	
	(ベミロラスタリウム)		(ベミロラスタリウム)		(トラニラスト)	
						
	●錠 5mg	●錠 10mg	●錠 5mg	●錠 10mg	●ドライシロップ 0.5% 2.5mg/0.5g, 5mg/1g, [100g, 500g]	●カプセル 100mg
成人	気管支喘息: 1回10mgを1日2回朝食後及び夕食後(又は就寝前) アレルギー性鼻炎: 1回5mgを1日2回朝食後及び夕食後(又は就寝前)		気管支喘息: 1回10mgを1日2回朝食後及び夕食後(又は就寝前) アレルギー性鼻炎: 1回5mgを1日2回朝食後及び夕食後(又は就寝前)		1回100mgを1日3回	
小児	—		—		—	
	リザベン [キッセイ薬品工業]		シングレア [MSD]		その他の抗アレルギー薬	
	(トラニラスト)		(モンテルカストナトリウム)			
						
	●細粒 10% 50mg/0.5g, 100mg/1g, [120g, 600g]	●ドライシロップ 5% 2.5mg/0.5g, 50mg/1g, [120g, 600g]	●錠 5mg	●錠 10mg	●チュアブル錠 5mg	●細粒 4mg/0.5g
成人	1回100mgを1日3回		気管支喘息: 1回10mgを1日1回就寝前 アレルギー性鼻炎: 1回5~10mgを1日1回就寝前		—	
小児	1日量5mg/kgを1日3回に分ける		—		気管支喘息: 6歳以上 1回5mgを1日1回就寝前 1歳以上6歳未満 1回4mgを1日1回就寝前	
	キプレス [杏林]		オノン [小野薬品工業]			
	(モンテルカストナトリウム)		(プランルカスト水和物)			
						
	●錠 5mg	●錠 10mg	●チュアブル錠 5mg	●細粒 4mg/0.5g	●カプセル 112.5mg	●ドライシロップ 10% 50mg/0.5g, 70mg/0.7g, 100mg/1g, [100g, 500g]
成人	気管支喘息: 1回10mgを1日1回就寝前 アレルギー性鼻炎: 1回5~10mgを1日1回就寝前		—		—	
小児	—		気管支喘息: 6歳以上 1回5mgを1日1回就寝前 1歳以上6歳未満 1回4mgを1日1回就寝前		—	

(2011年1月現在の添付文書より)
各薬剤の「効能・効果」「用法・用量」及び使用上の注意などは製品添付文書をご確認ください。


*用法・用量は有効成分量で記載 *ドライシロップ・細粒の表示: 成分量/製剤量, [バラ包装製剤量]

バイナス [日本新薬]

(ラマトロバン)

アイビーディ [大鵬薬品工業]

(スプラタストシル酸塩)



●錠 50mg




●錠 75mg



●カプセル 50mg



●カプセル 100mg



●ドライシロップ5% 37.5mg/0.75g, 75mg/1.5g, [100g, 500g]

用法・用量
成人
小児

1回75mgを1日2回朝食後および夕食後(又は就寝前)

—

1回100mgを1日3回毎食後

—

1回3mg/kgを1日2回朝食後及び夕食後

用法・用量
成人
小児

第一世代抗ヒスタミン薬一覧表

一般名	商品名	メーカー名
ジフェンヒドラミン塩酸塩	ベナ	佐藤
	レスタミン	興和
シブロヘプタジン塩酸塩水和物	ベリアクチン	日医工
トリプロリジン塩酸塩水和物	ベネン	佐藤
ヒドロキシジン塩酸塩	アタラックス	ファイザー
プロメタジン塩酸塩	ヒベルナ	田辺三菱
	ピレチア	塩野義
ホモクロルシクリジン塩酸塩	ホモクロミン	エーザイ
アリメジン酒石酸塩	アリメジン	第一三共・ニプロパッチ
タンニン酸ジフェンヒドラミン	レスタミンA	興和
クロルフェニラミンマレイン酸塩	アレルギン	第一三共
	クロール・トリメトン	MSD
	ネオレスタミン	興和
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	ボララミン	MSD
ヒドロキシジパモ酸塩	アタラックス(P)	ファイザー
クレマスチンフマル酸塩	タベジール	ノバルティスファーマ

第二世代抗ヒスタミン薬一覧表

一般名	商品名	メーカー名
オロパタジン塩酸塩	アレロック	協和発酵キリン
エバスチン	エバステル	大日本住友
アゼラスチン塩酸塩	アゼブチン	エーザイ
エビナスチン塩酸塩	アレジオン	日本ベーリンガーインゲルハイム
セチリジン塩酸塩	ジルテック	第一三共・ユーシービー・ジャパン
	グラクソ・スミスクライン	
フェキソフェナジン塩酸塩	アレグラ	サノフィ・アベンティス
オキサトミド	セルテクト	協和発酵キリン
エメダスチンフマル酸塩	ダレン	MSD
	レミカット	興和・興和創薬
ケトチフェンフマル酸塩	ザジテン	ノバルティスファーマ
ペボタスチンベシル酸塩	タリオン	田辺三菱
メキタジン	ニボラジン	アルフレッサファーマ
	ゼスラン	旭化成ファーマ
ロラタジン	クラリチン	MSD・塩野義
レボセチリジン塩酸塩	ザイザル	グラクソ・スミスクライン

ケミカルメディエーター遊離抑制薬一覧表

一般名	商品名	メーカー名
ベミロラストカリウム	アレギサル	田辺三菱
	ベミラストン	アルフレッサファーマ
トラニラスト	リザベン	キッセイ薬品工業


その他の抗アレルギー薬一覧表

一般名	商品名	メーカー名
ブランルカスト水和物	オノン	小野薬品工業
モンテルカストナトリウム	キプレス	杏林
	シングレア	MSD
ラマトロバン	バイナス	日本新薬
スプラタストシル酸塩	アイビーディ	大鵬薬品工業

アトピー性皮膚炎診療ガイドライン,日皮会誌,119(8),1515-1534,2009(一部改変)

点眼薬-抗アレルギー点眼薬

カテゴリ色別: ヒスタミンH2受容体拮抗薬 メチルエーダー遊離抑制薬 その他

バタノール [協和発酵キリン・日本アルコン] (オロパタジン塩酸塩)		ザジテン [ノバルティスファーマ] (ケトチフェンマル酸塩)		リボスチン [参天] (レボカバステチン塩酸塩)		リボスチン [日本新薬・ヤンセンファーマ] (レボカバステチン塩酸塩)		インタール [サノフィアベンティス] (クロモグリク酸ナトリウム)		エリックス [千寿] (アンレキサノクス)	
											
●点眼液0.1% 5mL		●点眼液0.05% 5mL		●点眼液UD0.05% 0.4mL		●点眼液0.025% 5mL		●点眼液2% 5mL		●点眼液UD2% 0.35mL	
用法 用量 1回1～2滴、1日4回		1回1～2滴、1日4回		1回1～2滴、1日4回		1回1～2滴、1日4回		1回1～2滴、1日4回		1回1～2滴、1日4回	
アレギサル [参天] (ベミロラステカリウム)		ヘミラストン [アルフレッサファーマ] (ベミロラステカリウム)		リザベン [キッセイ薬品] (トラニラスト)		トラメラス [日本点眼薬研究所] (トラニラスト)		アイビナール [MSD] (イブジラスト)		ケタス [千寿] (イブジラスト)	
											
●点眼液0.1% 5mL		●点眼液0.1% 5mL		●点眼液0.5% 5mL		●点眼液0.5% 5mL		●点眼液0.01% 5mL		●点眼液0.01% 5mL	
用法 用量 1回1滴、1日2回		1回1滴、1日2回		1回1～2滴、1日4回		1回1～2滴、1日4回		1回1～2滴、1日4回		1回1～2滴、1日4回	
ゼベリン [わかもと・興和] (アシタザノラスト水和物)											
											
●点眼液0.1% 5mL											
用法 用量 1回1～2滴、1日4回											

点眼薬-ステロイド点眼薬

フルメトロン [参天] (フルオロメトロン)		サンテゾン [参天] (デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム)		リンデロン [塩野義] (ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム)		オルガドロン [MSD・第一三共] (デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム)		HCソロン [日本点眼薬研究所] (ヒドロコルチゾン酢酸エステル)		PSソロン [日本点眼薬研究所] (プレドニゾン酢酸エステル)		DMソロン [日本点眼薬研究所] (デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム)		フルオメソロン [日本点眼薬研究所] (フルオロメトロン)	
															
●点眼液0.02% 5mL ●点眼液0.1% 5mL		●点眼液0.1%、0.02% 5mL		●点眼液0.01% 5mL ●点眼・点耳・点鼻液0.1% 5mL ●リンデロン点眼・点耳液0.1% 5mL (フラジオマイシン硫酸塩含有)		●点眼・点耳・点鼻液0.1% 5mL、100mL		●点眼液0.5% 5mL		●点眼液0.11% 5mL		●点眼液0.1%、0.02% 5mL		●点眼液0.1% 1回1～2滴、1日2～4回 ●点眼液0.02% 1回1～2滴、1日2～4回 ●点眼液0.05% 1回1～2滴、1日3～5回	
用法・用量 1回1～2滴、1日2～4回		1回1～2滴、1日3～4回		点眼液0.01%:1回1～2滴、1日3～4回 点眼・点耳・点鼻液0.1%:1回1～2滴、1日3～4回 リンデロン点眼・点耳液0.1%:1回1～2滴、1日1～2回		眼科用:1回1～2滴、1日3～4回 耳鼻科用:1回1滴、1日1～数回		1回1～2滴、1日数回		1回1～2滴、1日数回		1回1～2滴、1日3～4回		用法・用量	

眼軟膏-ステロイド眼軟膏

ブレドニン [塩野義] (ブレドニゾン酢酸エステル)	サンテゾーン [参天] (デキサメタゾン)	リンデロンA [塩野義] (ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム[フラジオマイシン硫酸塩含有])
		
●眼軟膏0.25% 5g	●眼軟膏0.05% 3.5g	●眼軟膏0.1% (眼・耳科用) 5g

点鼻薬-ステロイド点鼻薬






アルデシンAQネーザル [MSD] (ベクロメタゾンプロピオン酸エステル)	リノコート [帝人ファーマ] (ベクロメタゾンプロピオン酸エステル)	フルナーゼ [グラクソ・スミスクライン] (フルチカゾンプロピオン酸エステル)	ナゾネックス [MSD] (モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物)	アラミスト [グラクソ・スミスクライン] (フルチカゾンフランカルボン酸エステル)	エリザス [日本新薬] (デキサメタゾンシベシル酸エステル)
					
●50μg	●パウダースプレー (鼻用) 25μg ●鼻用カプセル	●点鼻液 50μg (28噴霧用、56噴霧用)	●点鼻液 50μg (56噴霧用、112噴霧用)	●点鼻液 27.5μg (56噴霧用)	●カプセル (外用) 400μg *専用噴霧器あり
用法・用量 成人 各鼻腔1噴霧、1日4回 小児 各鼻腔1噴霧、1日2回	用法・用量 成人 各鼻腔1噴霧、1日2回 小児 各鼻腔1噴霧、1日2回	用法・用量 成人 各鼻腔1噴霧、1日2回 小児 各鼻腔1噴霧、1日2回	用法・用量 成人 各鼻腔2噴霧、1日1回 小児 各鼻腔1噴霧、1日2回	用法・用量 成人 各鼻腔2噴霧、1日1回 小児 各鼻腔1噴霧、1日1回	用法・用量 成人 各鼻腔1噴霧、1日1回 小児 各鼻腔1噴霧、1日1回

点鼻薬-血管収縮薬

トーク [アルフレッサファーマ] (トラマゾリン塩酸塩)	トラマゾリン [アルフレッサファーマ] (トラマゾリン塩酸塩)	ナシビン [佐藤] (塩酸オキシメタゾリン)	フリビナ [ノバルティスファーマ] (ナファゾリン硝酸塩)	ナーベル [日東メディック] (硝酸テトラヒドロゾリン)	コールタイジン [陽進堂] (塩酸テトラヒドロゾリン液[プレドニゾン含有])
					
●点鼻液0.118% [100mL, 500mL]	●点鼻液0.118% [100mL, 500mL]	●点鼻・点眼液0.05% [500mL]	●点鼻液0.05% [500mL]	●点鼻・点眼液0.1% [500mL]	●点鼻液 [15mL]
用法・用量 1回2～3滴、1日数回点鼻、又は1日数回噴霧	用法・用量 1回2～3滴、1日数回点鼻、又は1日数回噴霧	用法・用量 点鼻: 1回2～3滴、1日1～4回 点眼: 1回1～2滴、1日1～4回	用法・用量 1回2～4滴、1日1～2回噴霧	用法・用量 点鼻: 6歳以上成人 3～5時間ごとに2～3回噴霧 点眼: 成人 1回1～2滴、1日2～4回	用法・用量 3～5時間ごとに2～3回噴霧、又は2～4滴を点鼻



ステロイド外用薬

カテゴリー色別: ストロングゲスト ベリーストロング ストロング ミディアム ウィーク

デルモベート [グラクソ・スミスクライン] (クロベタゾールプロピオン酸エステル)	ジフラール [アステラス] (ジフロラゾン酢酸エステル)	フルメタ [塩野義] (モメタゾンフランカルボン酸エステル)	アンテベート [鳥居薬品] (ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル)
 ●軟膏0.05% 5g, 30g  ●クリーム0.05% 5g, 30g	 ●軟膏0.05% 5g, 10g  ●クリーム0.05% 5g, 10g	 ●軟膏0.1% 5g, 10g, 200g  ●クリーム0.1% 5g, 10g, 30g  ●ローション0.1% 10g	 ●軟膏0.05% 5g, 10g, 100g, 500g  ●クリーム0.05% 5g, 10g, 100g, 500g  ●ローション0.05% 10g
トプシム [田辺三菱]	リンデロンDP [塩野義] (フルオシノニド)	リンデロンDP [塩野義] (ベタメタゾンジプロピオン酸エステル)	マイザー [田辺三菱] (ジフルブレドナード)
 ●軟膏0.05% 5g, 10g, 500g  ●クリーム0.05% 5g, 10g, 500g	 ●Eクリーム0.05% 5g, 10g  ●ローション0.05% 10g  ●スプレー0.0143% 28g	 ●軟膏0.064% 5g, 10g, 200g  ●クリーム0.064% 5g, 10g, 30g  ●ゾル0.064% 10g	 ●軟膏0.05% 5g, 10g, 30g, 100g, 500g  ●クリーム0.05% 5g, 10g, 30g, 100g, 500g
ビスダーム [帝國・日医工] (アムシノニド)	テクスメテン [佐藤] (ジフルコルトロン吉草酸エステル)	ネリゾナ [バイエル薬品] (ジフルコルトロン吉草酸エステル)	
 ●軟膏0.1% 5g, 500g  ●クリーム0.1% 5g, 500g	 ●軟膏0.1% 5g, 10g, 30g, 100g  ●ユニバーサルクリーム0.1% 5g, 10g, 30g, 100g	 ●軟膏0.1% 5g, 10g, 30g, 500g  ●クリーム0.1% 5g, 10g	 ●ユニバーサルクリーム0.1% 5g, 10g, 30g  ●ゾリューション0.1% 10mL

ステロイド外用薬

カテゴリー色別: ストロンゲスト ベリーストロング ストロング ミディアム ウィーク

アルメタ [塩野義] (アルクロメタゾンプロピオン酸エステル)	キンダベート [グラクソ・スミスクライン] (クロベタゾン酪酸エステル)	ロコイド [鳥居薬品] (ヒドロコルチゾン酪酸エステル)	グリメサゾン [第一三共] (デキサメタゾン)	オイラゾン [ノバルティス] (デキサメタゾン)
				
●軟膏0.1% 5g、10g、200g	●軟膏0.05% 5g、10g	●軟膏0.1% 5g、10g、100g、500g ●クリーム0.1% 5g、10g、100g、500g	●軟膏(グリテール含有) 5g、10g、100g	●クリーム0.1%、0.05% 5g

*軟膏・クリームは5g(製剤量)の写真を掲載

外用薬の正しい塗り方

[Finger Tip Unit]

ひとさし指の第一関節までの量(0.5g)が、
大人の手の2枚分の面積量



●第一関節までの量(0.5g)



●大人の手の2枚分の面積に対する量に相当

ステロイド外用薬一覧表

ストロンゲスト		
一般名	商品名	メーカー名
0.05%クロベタゾールプロピオン酸エステル	デルモベート	グラクソ・スミスクライン
0.05%ジフロラゾン酢酸エステル	ジフラル	アステラス
	ダイアコート	ファイザー
ベリーストロング		
一般名	商品名	メーカー名
0.1%モメタゾンフランカルボン酸エステル	フルメタ	塩野義
0.05%ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	アンデベート	鳥居
0.05%フルオシノニド	トプシム	田辺三菱
0.064%ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	リンデロンDP	塩野義
0.05%ジフルブレドナード	マイザー	田辺三菱
0.1%アムシノニド	ビスダーム	帝國、日医工
0.1%ジフルコルトロン吉草酸エステル	テクスメン	佐藤
	ネリゾナ	バイエル
0.1%酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	バンデル	大正富山
ストロング		
一般名	商品名	メーカー名
0.3%デブロンプロピオン酸エステル	エクラー	久光
0.1%デキサメタゾンプロピオン酸エステル	メサデルム	岡山大鶴
ストロング		
一般名	商品名	メーカー名
0.12%デキサメタゾン吉草酸エステル	ボアラ	マルホ
	ザルックス	アボットジャパン
0.12%ベタメタゾン吉草酸エステル	ベトネベート	グラクソ・スミスクライン、第一三共
	リンデロンV	塩野義
0.025%ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	プロパデルム	協和発酵キリン
0.025%フルオシノロンアセトニド	フルコート	田辺三菱
ミディアム		
一般名	商品名	メーカー名
0.3%ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	リドメックス	興和創薬
0.1%トリアムシノロンアセトニド	レダコート	アルフレッサファーマ
0.1%アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	アルメタ	塩野義
0.05%クロベタゾン酪酸エステル	キンダベート	グラクソ・スミスクライン
0.1%ヒドロコルチゾン酪酸エステル	ロコイド	鳥居
0.1%デキサメタゾン	グリメサゾン	第一三共
	オイラゾン	ノバルティスファーマ
ウィーク		
一般名	商品名	メーカー名
0.5%ブレドニゾン	ブレドニゾン	

アトピー性皮膚炎診療ガイドライン、日皮会誌、119(8)、1515-1534、2009(一部改変)