

アルツハイマー型認知症治療薬一覧表

2011年8月現在

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|--|--|--|---------|--|---|---|--|---------|
| 内用薬(飲み薬) | アリセプト錠 |  <p>3mg</p> |  <p>5mg</p> |  <p>10mg</p> | 実物大の70% | アリセプトD錠 |  <p>3mg</p> |  <p>5mg</p> |  <p>10mg</p> | 実物大の70% |
| | メマリー錠 |  <p>5mg</p> |  <p>10mg</p> |  <p>20mg</p> | 実物大の70% | レミニールOD錠 |  <p>4mg</p> |  <p>8mg</p> |  <p>12mg</p> | 実物大の70% |
| | レミニール錠 |  <p>4mg</p> |  <p>8mg</p> |  <p>12mg</p> | 実物大の70% | アリセプト内服ゼリー |  <p>3mg</p> |  <p>5mg</p> |  <p>10mg</p> | 実物大の35% |
| | アリセプト細粒0.5% |  <p>3mg</p> <p>分包 0.6g</p> |  <p>5mg</p> <p>分包 1.0g</p> | | 実物大の35% | レミニール内服液4mg/mL |  <p>4mg/1mL</p> |  <p>8mg/2mL</p> |  <p>12mg/3mL</p> | 実物大の35% |
| 外用薬(パッチ剤) | リバスタチグミン |  <p>4.5mg リバスタチグミン (/)</p> <p>4.5mg</p> |  <p>9mg リバスタチグミン (/)</p> <p>9mg</p> |  <p>13.5mg リバスタチグミン (/)</p> <p>13.5mg</p> | |  <p>18mg リバスタチグミン (/)</p> <p>18mg</p> | 実物大 | | | |

アルツハイマー型認知症治療薬の剤形


監修：順天堂大学医学部附属 順天堂東京江東高齢者医療センター 薬剤科 佐藤 邦義 先生

貼付剤




薬の成分が含まれた貼り薬で、皮膚を通して成分が吸収され、効果を発揮します。飲み薬とは違い、使用状況を一目で確認できます。また食事の有無にかかわらず投与でき、投与タイミングを制約されません。

錠剤




薬を一定の形に圧縮加工したものです。噛み砕かずに水といっしょに服用します。

口腔内崩壊錠(OD錠)



錠剤の中でも、口の中ですぐに溶けるように工夫されたものです。口の中で溶かして服用します。水なしでも服用できます。

細粒




薬を粉末状に加工したものです。水といっしょに服用します。

内服ゼリー



薬をゼリー状に加工したものです。適度な硬さととろみがあり、錠剤や粉薬を服用することが困難な方でも服用できます。食品のゼリーのようにスプーンですくってそのまま服用します。

内用液



薬を液体状に加工したものです。そのまま服用するか、水などにうすめて服用します。錠剤や粉薬を服用することが困難な方でも服用できます。